

ATRATIVO ALIMENTAR PARA MOSCA-DAS-FRUTAS



1L

ANAMED[®]

WB

ADJUVANTE - INSUMO AGRÍCOLA DE
VENDA LIVRE, CONFORME ATO
Nº 104 DE 20/11/2017 DO MAPA

**ARMAZENAR EM LUGAR SEGURO,
LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

INDÚSTRIA BRASILEIRA

REV01

DESCRIÇÃO ANAMED WB é um atrativo alimentar para as moscas-das-frutas, indicado como adjuvante potencializador em mistura com inseticida.

COMPOSIÇÃO

Proteínas, açúcares 48%
Inertes: diluentes, conservantes, espessantes 52%

INDICAÇÃO DE USO Como atrativo para mosca-das-frutas, família Tephritidae, especialmente para *Anastrepha spp*, *Bractocera spp* e *Ceratitis capitata*. Usar em culturas agrícolas onde são detectadas moscas-das-frutas. Atente à vegetação circundante que pode servir como local de refúgio para os insetos.

INSTRUÇÕES DE USO ÉPOCA: Aplicar a mistura de ANAMED WB mais inseticida e água na primeira detecção das moscas-das-frutas na cultura em armadilhas de monitoramento. PREPARO DA MISTURA: Misture 1 parte da ANAMED com 1 parte de água limpa. Aumente a quantidade de água para climas secos: misture 1 parte da ANAMED com 2 partes de água limpa. Adicione um inseticida aprovado para o inseto-alvo e para a cultura agrícola. Misture bem. Após esvaziar a embalagem de ANAMED WB, coloque uma pequena quantidade de água no seu interior para soltar as sobras de produto fixadas nas paredes e adicione ao pulverizador junto ao restante da mistura. EQUIPAMENTOS: Use pulverizadores manuais ou mecânicos para garantir a aplicação no local correto, na quantidade e tamanho de gota desejada. Após o uso do equipamento de aplicação, lave-o com água morna e detergente neutro. APLICAÇÃO: Direcione o jato do pulverizador para o caule da árvore ou para o centro da folhagem. Evite aplicar diretamente sobre as frutas. Aplique gotas de 4 mm de diâmetro ou mais para otimizar a vida útil do produto. CUIDADOS GERAIS: Consulte um técnico habilitado para determinar a época e dose correta de aplicação. Para melhores resultados, remova as frutas caídas da área. ADVERTÊNCIAS: A descoloração localizada pode ocorrer quando a mistura for aplicada diretamente em frutas ou folhas. Isso não danificará a planta. ANAMED WB não controla larvas. Utilize dentro de 24 horas depois de mistura. Evite a aplicação nas horas mais quentes do dia. RESTRIÇÕES DE USO: Não aplicar se houver previsão de chuvas dentro de 8 horas. Não aplique em superfícies molhadas.

VOLUME RECOMENDADO: Aplique, por hecta-

re, de 2 a 3 litros da mistura de ANAMED WB mais inseticida e água.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA Use Equipamentos de Proteção Individual (EPI): macacão impermeável, máscara com filtros, luvas e botas. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão, não provoque vômito. Em caso de contato com os olhos, lave em água corrente por 15 minutos. Em caso de contato prolongado com a pele, lave com água corrente e sabão neutro. Em caso de inalação, retire a pessoa para um local aberto e ventilado. Para todos os casos acima, procure imediatamente assistência médica levando a embalagem e rótulo do produto. Não reutilize a embalagem vazia, encaminhe para empresas autorizadas para destinação final, observando a legislação local.

ATENÇÃO! Ao manipular a mistura de ANAMED WB com inseticida e água siga todas as recomendações da bula do inseticida.

ARMAZENAGEM Armazene o produto em área sombreada, ventilada, protegida do calor e dos raios solares. Para otimizar a vida útil do produto, não exceda 25°C. Não congele. A cor do produto pode mudar com o tempo, isso é normal e não afetará sua eficácia. O produto pode apresentar separação de fases durante o armazenamento.

VALIDADE E LOTE Impressos na embalagem.

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.

FABRICANTE

ISCA

ISCA Tecnologias Ltda.
BR 285, km 461,1, nº 2951
Ijuí-RS, 98700-000, Brasil
CNPJ: 01.745.592/0001-33
+55 (55) 3332-2326
www.isca.com.br